


SITUACIÓN NACIONAL DE LA ROYA DEL CAFÉ AL MES DE MARZO 2020

Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Café
Departamento de Investigación y Desarrollo
Gerencia Técnica IHCAFE

UMBRALES DE RIESGO

La alerta epidémica consiste en cinco categorías:




- Azul o riesgo mínimo (incidencia entre 0-5%),
- Verde o nivel de riesgo bajo (incidencia entre 5.1%-10%),
- Amarilla o nivel de riesgo moderado (incidencia entre 10.1-15%),
- Naranja o nivel de riesgo alto (incidencia entre 15.1%-20%) y
- Roja con el nivel de riesgo máximo e incidencias mayores al 20%.



UMBRALES NACIONALES

AMENAZA	ACTUAL (FINALES DE MARZO)
Roya en Variedades Susceptibles	Alerta Verde
Roya en Variedades Resistentes	Alerta Azul


REPRESENTATIVIDAD DE CATEGORIAS EN MUESTRO NACIONAL MARZO 2020




■ Variedades susceptibles

■ Variedades resistentes


CURVA DE COMPORTAMIENTO DE LA ROYA DEL CAFÉ, VIGILANCIA EN VARIEDADES SUSCEPTIBLES




INCIDENCIA DE LA ROYA DEL CAFÉ EN VARIEDADES SUSCEPTIBLES POR DEPARTAMENTO, MARZO 2020.



INCIDENCIA DE LA ROYA DEL CAFÉ EN VARIEDADES SUSCEPTIBLES, MARZO 2020.




REPRESENTATIVIDAD DE VARIEDADES (%) CATEGORÍA SUSCEPTIBLES, MUESTREO NACIONAL MARZO 2020




Observación: IHCAFE 90 Con resistencia genética suplantada (perdida) recientemente, pasa a formar parte de esta categoría.


CURVA DE COMPORTAMIENTO DE LA ROYA DEL CAFÉ, VIGILANCIA EN VARIEDADES RESISTENTES




INCIDENCIA DE LA ROYA DEL CAFÉ POR VARIEDAD RESISTENTE, MARZO 2020



REPRESENTATIVIDAD DE VARIEDADES (%) CATEGORÍA SUSCEPTIBLES, MUESTREO NACIONAL MARZO 2020.



INCIDENCIA DE ROYA DEL CAFÉ POR PISOS ALTITUDINALES, MARZO 2020





Consideraciones:

- La condiciones ambientales típicas de verano han sido lo suficientemente desfavorables para reducir la incidencia promedio de la roya del café, sumado a esto la etapa de revestimiento foliar que en este momento esta ocurriendo y la caída de hojas infectadas de roya contribuyen para este declive de la roya del café.
- Con la perdida de la resistencia genética de la variedad IHCAFE 90, esta a pasado a formar parte de la categoría susceptible, por lo que la proporción de estas variedades a pasado a ser aproximadamente a un 90% y el restante 10% de variedades son resistentes (de las parcelas en producción muestreadas mensualmente).
- Si no se realizo un eficiente control de roya durante el 2019 y en estos momentos la parcela presenta incidencias aun altas, es recomendable hacer una aplicación de fungicidas para disminuir el inculo ambiental presente, de modo que cuando inicie el próximo ciclo epidemiológico de la enfermedad (mayo-junio), este inicie lo mas bajo posible y sea mas fácil controlar la enfermedad durante su periodo de control (mayo – septiembre).



COLABORADORES TÉCNICOS:



¡Gracias por su atención!

Contacto: satihcafe@ihcafe.hn ; cristianlizard@yahoo.com

Móvil: 9454-86-63